

嬰

童

百

問

嬰童百問卷之二

肺臟 第十一問

脾盛復有冷風胸滿短氣氣急喘嗽上氣堂

後發散風冷散肺瀉白散主之肺只傷寒則不胸滿
肺熱則手掐着眼鼻而甘桔湯主之肺虛熱唇深紅
色治之散肺虛熱少服瀉白散肺臟怯唇白色當補
肺阿膠散主之若悶亂氣粗喘促哽氣者難治肺虛
損故也脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母也母子
皆虛不能相營故曰怯肺主唇白而光澤者吉白如

枯骨者死。肺病春見。肺臟勝肝。當補腎肝。治肺臟肝
怯者受病也。補肝腎。地黃丸。治肺。瀉白散。主之。肺病
見春。旺肺勝肝。當瀉肺。輕者肺病退。重者目淡青色。必
發驚。更有赤者。當瀉為肝怯。當目淡青色也。

瀉白散

地骨皮

桑白皮

炒各一兩

甘草

炙一錢

右剉一劑。粳米一撮。水二盞。煎一盞。食前服。

甘桔湯

治風熱毒氣上攻。咽喉疼痛。喉閉腫塞。妨問。

肺壅咳嗽咯唾膿血胸滿振寒咽乾而渴時出
濁沫氣息腥臭久久吐膿狀如米粥又治傷寒
咽症

桔梗 二兩 甘草 一兩

右爲粗末每服二錢水一盞煎至七分去滓食
後溫服加荊芥防風名如聖湯熱甚加羌活黃
芩升麻

阿膠散

治嗽肺無津液喘急肺虛者咳而哽氣有聲

阿膠

一兩半
蛤粉炒

鼠黏子

二錢半
炒香

馬兜鈴

半兩
焙

甘艸

一錢
炙

杏仁

七箇
去皮尖

糯米

一兩

右為末。每服二錢。水一盞。煎六分。食後溫服。

地黃丸

熟地黃

山茱萸

乾山藥

各四錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

各三錢

右為末。煉蜜丸。如桐子大。三歲以下。一二九空。

心白湯化下。行遲。鶴膝。加鹿茸。牛膝。五加皮。

腎臟 第十二問

腎虛兒本虛怯由胎氣不成則神氣不足目中白睛多其顙卽解顙開面色晄白此皆難養縱長不過八八之數若恣于色慾多不過四旬而亡或有因病而致腎虛者非也又腎氣不足則下竅益骨重惟欲下而縮身也腎水陰也腎虛則畏明皆宜補腎丸主之腎病見夏水勝火腎勝心也當重腎輕心退重者悸動當攝也。

地黃丸

治腎疳卽急疳腦熱肌削手足如米滑洩腹痛

熟地黃

山茱萸肉

乾山藥

各四錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

去皮各三錢

右爲末。煉蜜和丸如梧桐子大。三歲以下。一二丸至三丸。溫水空心化下。行遲鶴膝。加鹿茸牛膝五加皮。

面上證氣色總見 第十三問○無方

左腮爲肝。右腮爲肺。額上爲心。鼻上爲脾。下頰爲腎。赤者熱也。隨證治之。此仲陽之至論也。口議所謂五位氣色總見者。其藍青色者。乃驚積不散。欲發風候。其火紅色者。痰積壅盛。驚悸增進。其黃土色者。食積癥傷。欲作疳疾。疳癰。其色白者。大腸滑洩。水穀不分。欲作吐利。其黑色者。臟腑欲絕。其疾危惡。其兒不久也。又有面部形色。額有青色。主驚風欲發紅。主大熱。印堂青色。初入驚。并瀉。紅主大驚。夜啼。黑主客忤。山

根青至。主二次驚青色主瀉後發躁黑色及黃甚主
死。年壽平陷者主夭。青主發熱生驚黑主利死紅主
燥死微黃曰平。黃甚主霍亂死。鼻準微黃曰平。黃甚
爲土動死候黑赤危甚。人中黑主蛔蟲咬患久唇反
者死。短縮者困利死。邊旁黃主胃逆青色主下利正
口紅者平。乾燥脾熱白主失血死。黃有積青因驚風
死。黑氣遶口者死。承漿青因飲食時被驚黃主吐逆。
赤主血痢赤黑主驚風。兩眼黑睛黃有熱白睛黃食
積不化。疳蛔。白睛青肝風驚黑睛黃傷寒。脊上青黃。

忽紅主煩燥夜啼黃主霍亂久病紅者死風氣二池
青主風候紫主吐逆又發熱黃吐逆紅主煩躁夜啼
兩額赤色肺有客熱兩太陽青主二次受驚青自太
陽入耳者死紅主血淋兩臉青主客忤黃主痰溢赤
風熱兩頰赤主傷寒左赤心熱口瘡右赤肺熱黃
主有積紅主血淋兩頰青主吐蟲兩金匱青主第三
次驚生風黑遶口二日死青連目入耳七日死兩風
門紅主風熱黑主疝青水驚黑從眉入耳當日死
黑不食者死又面青眼青肝之病面赤心之病面白

肺之病而黃。脾之病而黑。腎之病而五臟各有所主。看
稟受盈虧。胎氣虛實。陰陽補瀉。當救其失。臟腑表裏。
若能辨其標本。則神聖工巧。自然得矣。

發搐

第十四

仲陽云驚癇發搐男發搐目左視無聲右視有聲女
發搐目右視無聲左視有聲相勝故也早辰發搐因
潮熱寅卯辰時身體壯熱上視手足動搖口內生涎
項頸急此肝旺當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青
丸主之日午發搐因潮熱巳午未時發搐心神驚悸
目上視白睛赤色牙關緊口內生涎手足動搖此心
取也當補肝治心治心導赤散涼驚丸補肝地黃丸
主之日晚發搐因潮熱申酉戌時不其搐而喘目微

邪視身體似熱睡露睛手足冷大便淡黃水是肺旺
當補脾治心治肝補脾益黃散治肝瀉青丸治心導
赤散主之夜間發搐因潮熱亥子丑時不甚搐而臥
不穩身體溫壯目睛緊邪視喉中有痰大便白色乳
食不消多睡不省不納津液當補脾治心補脾益黃
散治心導赤散涼驚丸主之凡急驚欲發先看握拳
指內陰順指外陽順男左女右搐須令全用藥通關
大忌悶涎入肺逆入心經某能語言卽與涼心鉤驚
下痰藥始安如逆搐者便不可救若因吐瀉後變證

却難調治大凡此證要看握拳逆順若搐握
理搐逆恐其復潮先用通關勝撚兒保命丹省風湯
後用疎風化痰退熱等藥便可無事又有驚風搐搦
吐瀉多啼急搐眼後有淚面紅則難瘥愛哭心中聚
涎臉有紅筋乃是癇疾指亂青紋疾病又傳下驚風
驚風鎮墜太過風疾不散與氣相逆搐不能定當下
轉氣疎風藥溫膽湯加酸棗仁服次省風湯化蘇青
丸又有急驚偏喎面青背冷男左女右不妨男右女
左難治如尋心冷汗搐斜搐肚終日終夜不定者名

真搐兩肩都動此乃掣證不惟定搐亦要順氣當下
參湯平其胃氣却進川烏全蝎等藥并順氣藥亦要
斡旋仲陽論傷風後發搐若傷風後得之口中氣出
熱呵欠頓悶手足動搖當發散大青膏主之傷食後
發搐若傷食後得之身體溫多睡多唾或吐不思飲
食而發搐當先定搐搐退白餅子下之後服安神丸
入百日內發搐真者不過三兩次必死假者頓發不
為重真者內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未實不
能勝任乃發搐也欲知假者口中氣出熱也治宜發

散。大青膏主之。仍用塗顙浴體法。珍珠丸下痰卽定。
有熱不大便者。七寶洗心散。寬熱散下之。卽效。却用
截風定痛天麻防風丸。龍齒散。釣藤散等劑調理。有
熱瘡疥或不語。防風通聖散。大連翹湯皆可服。

瀉青丸

當歸

龍膽艸

川芎

防風

大黃

羌活

山梔仁

等分一方加
甘艸芍藥

右爲末。煉蜜丸雞頭大。每服一九。沙糖湯下。

導赤散

生地黃

甘艸

生

木通

各等分

右咬咀。竹葉煎。加黃芩赤芍藥羌活燈心煎。

涼驚丸

潮熱口內涎手足動搖此心旺也

治驚疳有熱發搐心神驚悸上視赤色牙關緊

黃連

末五分

龍腦

一錢

龍膽

三錢

防風

三錢

青黛

三錢

釣藤

二錢

牛黃

一字

麝香

一字

一右同研麪糊丸粟米大每服三五丸至一二十

丸煎金銀湯送下

地黃丸

熟地黃 山茱萸 乾山藥 各四錢

澤瀉 牡丹皮 白茯苓 去皮各三錢

右為末煉蜜丸如梧子大空心溫水化下三九

益黃散

陳皮 去白一兩 丁香 二錢一方用木香 訶子 炮去核

青皮 法白 甘艸 炙各半兩

右為末三歲兒一錢半水半盞煎三分食前服

通關散

治諸風搐搦關竅不通皆由痰塞中脘留滯百

節所致痰之所爲潮塞者氣實使之

南星炮一錢麝香一字猪牙皂一錢略燒存性

赤蜈蚣一條直殭蠶一錢

右爲末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴入藥兩三點涎自出

嚏關散

生半夏一錢皂角半錢

右爲末用一豆許用管子吹入鼻立醒

開關如聖散

赤蜈蚣

一條中分為兩片各用葱汁浸一宿焙乾

全蝎

一箇亦剖分為兩片各記左右以二物各記左右分兩處

右各為末左眼翻左手搗以左藥末搗入左鼻孔右眼翻右手搗以右藥末搗入右鼻孔雙眼翻雙手搗兼之

至聖保命丹

治小兒胎驚內釣腹肚緊硬眠睡不安夜多啼哭及治急慢驚風目眼上視手足抽掣不省人事悉皆主之冷證用此

全蝎

去尾十四箇

防風

二錢

白附子

一錢

炮南星

一錢有熱用膽星

蟬蛻

一錢

殭蠶

去絲炒

天麻

二錢

朱砂

一錢

麝香

半錢

金箔

十片

有熱證加牛黃

冰片

硼砂

各少許

右爲末。粳米糊丸。每兩作四十九。常服鎮心安。

神化痰除一切驚風諸證湯。臨時換一方。加人。

參白茯苓二錢。

省風湯

治驚風口噤。筋脈攣急。抽掣疼痛。風盛痰。

暈爛仆頭目眩胸膈煩滿恍惚不定神志昏憒

大南星

生川

防風

去蘆各四兩

甘艸

生用

半夏

米泔浸一宿

黃芩

去粗皮各一兩

右咬咀每服二錢生薑一片煎去滓不拘時服

溫膽湯

治驚悸煩躁不得眠

半夏

枳實

各二錢半

茯苓

半兩

橘紅

甘艸

各一錢半

酸棗仁

去殼二錢半

腹疼加芍藥

右咬咀每服一錢入竹茹少許薑棗煎服

玉餅子

治小兒夾食傷寒其證發熱嘔吐亦有肚疼者
噯氣辨得分曉先用此藥一服推下食積却用
平和藥發散調治如惺惺散加減參蘇飲皆妙

滑石末

一錢

輕粉

半錢

半夏末

一錢

南星末

一錢

巴豆

廿四箇去皮膜用水一升煮乾研細

右三味搗羅爲末入巴豆粉次入輕粉又研勻

却入餘者藥末如法令勻糯米粉丸如菉豆大
量小兒虛實用藥三歲已下每服三丸至五丸

空心紫蘇湯下忌熱物若三五歲兒壯實者不
以此拘加至二十丸以利爲度

安神丸

人參 茯神 麥門冬 乾山藥

龍腦各二錢 龍齒一錢 朱砂 甘艸

寒水石末各半錢 金箔二片

右爲末蜜丸雞豆大燈心湯調下

大青膏

天麻一錢 白附子半生半熟一錢 蝎尾半錢

朱砂

一字

青黛

一錢

天竺黃

一字

麝香

一字

烏地

酒浸取肉
焙乾半錢

右爲末。生蜜丸如芡實大。月中兒粳米大。全牛

黃膏薄。奇湯化下。五歲以上。同甘露散服之。

奇州白丸子

一名蘇青丸

治一切風。小兒驚風。

天南星

二兩

白附子

二兩

川烏頭

去皮臍半

半夏

浸洗過白
好者七兩

右用井花水浸。晒過。次日早。再換新水。煮五日。

夏三日秋七日冬十日晒乾爲細末以糯米粉煎粥清爲丸如菉豆大小兒驚風薄苛湯調下和蘇合香丸服名蘇青丸

浴體法

天麻末

錢二

全蝎

去毒爲末

朱砂

各半錢

烏蛇肉

酒浸焙乾

白礬

各二錢

麝香

一字

青黛

三錢

右同研勻每用三錢水三碗桃枝一握葉五七枝同煎至十沸溫熱浴之勿浴背

塗頤法

麝香

一字

蝎尾

去毒為末半錢一作半字

薄荷葉

半字

蜈蚣末

牛黃末

青黛末

各一字

右同研用熟棗肉劑為膏新綿上塗勻貼顙上四方可出一指許火上炙手頻熨百日内外小兒可用此塗浴法。

珍珠丸

治小兒急驚風涎潮壯熱痰氣上壅

白明子

滑石

輕粉

各一錢

巴豆

十五粒去油

全蝎

半錢

右爲末。糊丸如小豆大三歲一九二九蕙湯下。

七寶洗心散

原係二方合成者詳見二十七問內

白朮

一錢半

甘草

炙

當歸

荆芥穗

麻黃

不去節

芍藥

大黃

麩裏煨去麩切焙各六錢

前胡

生地

各四錢

薄荷

少許

右爲末每服一錢水一盞入生薑一片煎服。

寬熱散

詳五十問中

枳殼

去白一兩以水潤之以巴豆四十九粒去皮同研却去巴豆

大黃

一兩

朴硝

半兩

甘草

半兩

右爲末以瓶器收之每服一字薄苛湯調下

天麻防風丸

詳五十四問中

天麻

防風

人參

辰砂

雄黃

麝香

甘艸

炙各一分

全蝎

炒

僵蠶

各半兩炒

牛黃

一字

一方有膽星無麝香

右爲末煉蜜丸如桐子大每服一丸薄苛湯下

惺惺散

詳五十四問中

天花粉

人參

細辛

白茯苓

去皮

白朮

甘艸

桔梗

各等分

右剉每服一錢水煎服

龍齒散

龍齒

蟬蛻

釣藤

羌活

茯苓

人參

等分

右爲末每服半錢薄荷湯下

釣藤散

詳十六問中

釣藤

三錢

蟬蛻

天麻

防風

蝎尾

人參

各半兩

麻黃

去節

僵蠶

炒

甘艸

炙

川芎

各一錢

麝香

一字

右爲末白水煎寒多加附子末半錢

防風通聖散 詳二十八問中

防風 去蘆半兩 荊芥 二錢半穗 川芎 當歸

薄荷葉 大黃 錦紋者佳 芍藥 麻黃 去節

連翹 去蒂 芒硝 各半兩 石膏 細紋者佳 黃芩

桔梗 各一兩 滑石 六兩 甘艸 二兩 白朮

梔子 各二錢半

右剉每服二錢水一盞薑二片煎七分去滓

大連翹湯

治瘡疹壯熱小便不通諸般瘡癰丹毒臍風

連翹

瞿麥

荊芥

木通

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

滑石

蟬蛻

甘艸

炒各一錢

山梔仁

黃芩

各半錢

右剉每服一錢加紫艸煎溫服熱甚加大黃更詳證加減爲佳。

急驚 第十五

急驚者因聞大聲及大驚而發搐發過則如故此無陰也當下利驚丸主之小兒急驚者本因熱生于心身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤劇則搐也蓋熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也故利驚丸主之以除其熱痰不可與巴豆及溫藥大下之恐搐虛熱不消也小兒熱痰客于心胃因聞聲非常則動驚搐矣若熱極雖不因聞聲及驚亦自發搐急驚之候牙關緊急壯熱涎潮竄視反張搐搦顛指開合動唇口

睂眼。眦引頻并口中熱氣。頰赤唇紅。大小便黃赤。其
脉浮數洪緊。蓋由內有實熱。外挾風邪。心經受熱而
積驚。肝經生風而發搐。治法大要用藥有序。通關以
後。且與截風定搐痰熱尚作。乃下之。痰熱一洩。又須
急與和胃定心之劑。如搐定而痰熱少者。則但用輕
藥消痰除熱可也。蓋急驚須當下。切不可過用寒涼。
及銀粉巴消輩。蕩滌太驟。此等重劑。醫家不得已而
用之。僅去疾卽止。或不當用而用。或當用而過焉。往
往由此而成慢驚矣。此證亦用搐鼻通關打噴嚏。牙

開開後用疎風化痰退熱藥導亦散柴胡天麻等劑
便可無事琥珀散通治諸經驚壯之要藥至寶丹亦
可服。

利驚丸

治小兒急驚風痰盛發熱潮搐

青黛

輕粉

各一錢

牽牛末

半兩

天竺黃

二錢

右爲末白麪糊丸如小豆大二十九丸薄荷湯下
一法煉蜜丸如炭實大一粒化下

導赤散

生地黄 生甘艸 木通各等分 竹葉 三片

右咬咀加黃芩赤芍藥羌活燈心煎服

至寶丹 詳二十問中

生犀屑 生瑤瑁屑 琥珀研細水飛

雄黃細研水飛各一兩 金箔五十片半為衣

銀箔五十片 麝香研各一錢 牛黃研半兩

安息香一兩半為末以無灰酒濾去砂石和取一兩慢火熬成膏

右和勻以安息膏丸如梧子大每歲一九人吞

湯化下

琥珀散

治小兒急慢驚風涎潮昏目目瞪搐搦驚吊肚
疼及和順痘瘡小可驚哭眠臥不安入口立效
驚癇時攻發作常服永除病根

辰砂一錢半 琥珀 牛黃 天麻

殭蠶剉去絲嘴 全蝎去毒 白附子 乳香

蟬蛻各一錢 麝香半錢 代赭石煨醋淬七次一錢

片腦一字 牛膽南星一字

右爲末三歲一錢薄苧湯下慢驚加附子一分

慢驚

第十六回

慢驚者。因病後。或吐。或瀉。脾胃虛損。遍身冷。口鼻氣
出亦冷。手足時時痺痠。昏睡露睛。此無陽也。枯莖湯
主之。凡慢驚之候。或吐。或瀉。痰鳴微喘。眼開神緩。睡
則露睛。驚跳搖擻。乍發乍靜。或身熱身冷。四肢熱。口
鼻冷氣。面色淡白。淡青。或唇青。其脉沉遲散緩。
蓋由急驚過用寒涼。或轉下太驟。傳變成之。又有吐
利不止而成者。有氣虛暴吐瀉而成者。有臟腑虛洞
泄而成者。有久利氣脫而成者。有取瀉下積而成者。

有吐血下血而成者。有感冒風不解。傷寒傳變而成者。
有久嗽作癰不已者。有蟲積衝心者。有疝氣腹痛者。
或日夜汗出。脾因多腫。煩躁引飲。四肢浮腫。大小便
閉。丹瘤腫毒。龍帶纏腰。走馬急疳。並傳慢候。惟吐瀉
積利成虛致之。則證變甚速。治法須當審問源流。不
可一槩用藥。曰慢候。如吐瀉得之。則理中湯加木香
以溫其中。五苓散以導其水。如臟寒洞泄得之。則先
與朮附湯。下積取轉得之。則先與調氣散。調和脾胃。
如外感風寒。則可與桂枝湯。葛根湯。輩其他可以類

推矣。然慢驚雖屬陰，亦須準較陰陽虧盛淺深。如何不可純用溫藥及燥烈大熱之劑。惟于生胃氣中，加以截風定搐，如全蝎、花蛇、僵蠶、白附、天麻、南星、藜蘆爲良方。傳慢候而尚有陽證者，不必回陽，但與截風調胃。可冷可熱，惟均平陰陽而已。太乙寶生丹、聚寶丹、蟬蝎散、神寶、既濟丹、來復丹、王氏惺惺散、醒脾散、大醒膠散、溫白丸可選而用之。若陽虧陰盛病已傳過純屬慢驚，無搐掣反引竄視之證，而但昏沈者，與星香全蝎散定命飲子、四聖散、烏蝎四君子湯、天南星

散易沉湯。沉香散之屬。若手足冰冷者。方可回陽。用硫黃附子。慢驚下痰身煖者。天南星丸。蘇合香丸。白丸子。痰盛者。神寶既濟丹。礞石散。虛甚不可下痰者。靈脂丸。七珍丸。如腦麝巴霜寒涼通開利腸之輩。一切禁止。如未發慢驚。先要睡吐舌搖頭面青毛髮豎。吐乳作腥。額上有汗。此證乃吐後胃虛生風。當下截風。聖脾散。或四君子湯加全蝎防風銀白散。或釣藤飲去麻黃。更宜多方走變藥餌。不可輕忽。又有慢驚。正公洩瀉吐乳冷汗。雙眼閉唇紅舌出。搖頭鬚直。用

脇動心悶氣粗口瘡當用南星末貼脚底心常進參湯尤好少間口瘡不納乳食名曰鎖脇却難救凡小兒病證見口如魚口作鵝聲者不治聖濟經有琥珀丸南星煎等劑皆可服論曰心藏神而惡熱小兒體性多熱若感風邪則風熱搏于腑臟其氣鬱憤內乘于心令兒神志不寧故發爲驚若驚甚不已則悸動不寧是爲驚悸之病紫金散牛黃散大丹砂丸治之其急驚則有龍齒散巨勝散等劑可選而用之

括夢湯

治慢驚

括蕞根

錢二

白甘遂

一錢

按本草

白甘遂

乃

右用慢火炒焦黃色研勻每服一字煎麝香薄

苛湯調下無時凡藥性雖冷炒焦用之乃溫也

理中湯

詳五十三問內

人參

錢二

白朮

乾薑

炮各等分

甘艸

炙減半

右剉散每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎服

五苓散

治霍亂吐瀉燥渴飲水小便不利

澤瀉

一兩

官桂

一兩

猪苓

白茯苓

白朮

各一兩半

右爲細末每服一錢白湯調下燥渴新水調服
大小以意加減不拘時候加辰砂一兩治驚熱
求附湯

治風溼相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴大
便堅硬小便自利及風虛目眩甚則口不知味

白朮

四兩

附子

炮去皮臍一兩半

甘艸

炙二兩

右剉每服三錢水盞半薑三片棗一個同煎服

調氣散

詳第五問中

木香

香附子

人參

橘皮

藿香

甘艸

炙各一錢

薑棗煎服

桂枝湯

治太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出。當發惡寒。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。

桂枝

去皮

芍藥

生薑

各半

甘艸

一兩

右剉每服三錢棗二个水一盞煎八分服須臾

啜粥一盞以助藥力溫覆令一時許通身熱微

汗出為佳。

減法桂枝自西北二方居人面

行之無不應驗。江淮唯冬及春可行之。自春及夏至已前。桂枝證可加知母石膏各半兩。或加升麻一分。若病人素虛寒者。正用古方。

葛根湯

治太陽病。項強几几。惡風。無汗。無惡寒。剛瘕。

葛根 西兩 麻黃 三錢 桂 一兩 甘艸 二兩

芍藥 二兩

右剉。每服五錢。水一盞半。生薑五片。棗二個。煎一盞。服取微汗。

太乙保生丹

治慢驚尚有陽證

全蝎

十四个

白附子

生

僵蠶

牛膽南星

蟬蛻

琥珀

各一錢

麝香

半錢

防風

朱砂

各一錢

金箔

二片作衣

右爲末每服二九薄荷湯下

聚寶丹

治慢驚風

人參

茯神

琥珀

天麻

僵蠶

防風

南星

生白附子

全蝎

烏蛇

朱砂

半錢

麝香

少許

右爲末煉蜜九桐子大每服一九菖蒲湯調下

蟬竭散

治方傳慢驚

全蝎

七个去尾

蟬退

一个

甘艸

二錢半炙

南星

一个泡

右爲末每服半錢煎服

神寶既濟丹

分陰陽平冷熱定吐瀉豁痰涎

硫黃

燄硝

鎔汁再研

五靈脂

青皮

陳皮

去白

半夏曲

炒等分

右爲末粟米糊丸麻子大每服三丸米飲送下

來復丹

此藥配類二氣均調陰陽奪天地冲和之氣有水火既濟之功補損扶虛妙難盡述

硝石

同硫黃並爲細末微火略炒用柳篦子不住手攪令陰陽氣相入不可火太過

硫黃

船上透明

太陰玄精石

研細水飛各一下

陳皮

去白

五靈脂

水澄去砂石日乾

青皮

去穰各二兩

右用靈脂二皮爲細末次入玄精石末及前二藥末拌勻以好醋打和爲丸如豌豆大每服三十粒空心粥飲下甚者五十粒小兒三粒新產

生嬰兒一粒小兒慢驚風或吐痢不止變成虛風搐搦者非風也胃氣欲絕故也用五粒呷下
王氏惺惺散

人參

茯苓

木香煨

天麻

白扁豆

陳皮炒

全蝎焙

右爲末每服半錢薑棗略煎服

醒脾散

全蝎

焙半錢

白附子

炮

天麻

焙

甘草

炙

人參

白茯苓

石菖蒲

木香

石蓮肉 白朮錢各一 有熱者去木香

右剉每服三錢薑二片棗一个水二小盞煎服

大醒脾散

南星 白茯苓 橘紅錢各一 全蝎焙

甘艸炙 白附子炮 石蓮子 人參

木香錢各半 陳倉米二百粒

右剉每服三字薑棗煎服驅風醒脾兩方通用

溫白丸 治風豁痰定驚

人參 防風 生白附 附子薑

全蝎

焙各一錢

南星

湯泡焙

天麻

各二錢

右爲末，麪糊丸桐子大，每服一丸，薑湯調下。

星香散

治慢驚風

南星

煨二錢

木香

人參

橘紅

各一錢

全蝎

炙三個

甘艸

炙半兩

有熱加防風

右剉，每服一錢，入紫蘇薑棗濃煎，旋以時送下。

定命飲

半夏

茯苓

木香

生薑

各一錢

白朮

甘艸

炙

天麻

各五分

右爲末每服半錢薑棗煎湯調下

四聖散

治慢驚吹入鼻中

全蝎

七个

僵蠶

十四个

南星

七錢半

川烏

二錢

右將南星爲末水調作餅裹蠶蝎川烏外用溼紙重包慢火中煨令赤色頓地上一伏時每服一字煎金銀湯點好茶清少許調下

烏蝎四君子湯

人參

白朮

甘草

白茯苓

等分

川烏

全蝎

各少許

右爲末。每服半錢。薑棗煎服。如再服。卽去川烏。

天南星散 驅風豁痰

南星

一个重九錢。以上者。就地上作小坑。深八寸許。炭火燒通紅。以好米醋半盞。洒

入坑中。卽納星于內。次以火炭密蓋之。又用盆蓋其上。一代時取出。燒淨切焙。

右末。每半錢。入琥珀全蝎各一錢。生薑湯調下。

烏沉湯

治慢驚祛風助胃

天麻

二錢

人參

生川烏

全蝎

焙

南星

炮

木香

沉香

各一錢

甘艸

炒半錢

右剉。每服三字。薑三片煎服。

沉香散

茯苓 二錢

沉香

丁香

木香

藿香

厚朴

製

甘艸

錢炙一

右為末。每服一字。米飲調下。

天南星丸

天南星

一斤。每一個重一兩。上下者用溫湯洗刮去裏外浮皮。酒浸一宿。用桑

柴蒸。不佳。添湯。蒸滿。既內氣透。更不佳。

酒。酒常令藥潤。伏時。滿取出。用銅刀切。

開一個大者。嚼少許。不離舌。為熟。未即

再炊。以熟為度。然後用銅刀切細。焙乾。

麝香

研

丁香

各一兩

龍腦

研兩

辰砂

各一兩

右爲末煉蜜并酒丸朱砂爲衣薑湯下一

礞石丸

礞石

搗碎

焰硝

半兩同合礞石入竈內用炭火煨令通紅候冷

右爲末雪糕薄糊丸棗豆大每服二九急風薄荷荳荊芥泡湯調下慢風慢脾風木香煎湯下礞石焰硝古文錢輩雖能利痰然其性非胃家所好故以木香佐之

靈脂丸

五靈脂

白附子

焙

木香

血竭

炒各一分

全蝎

錢半

朱砂

二錢

大南星

淨紙包火內煨半錢

右末米醋煮生半夏糊丸麻子大薑湯下三九

七珍丸

治頑痰壅盛

細辛

川靈芝

直殭蠶

一錢半

白附子

錢一

朱砂

半錢

全蝎

焙四个

右末大南星煮糊爲丸麻子大薑湯下每五九

四君子湯

治榮衛氣虛臍膈怯弱

人參

去蘆

茯苓

去皮

甘艸

白朮

各等分

銀白散

糯米

炒二兩

扁豆

蒸二兩

藿香

一分

白朮

炒一分

丁香

二錢

甘艸

炙三錢

右爲末。紫蘇米飲調下。加天麻砂仁白茯苓快

脾正色直指方加炮白附全蝎木香石蓮生薑

釣藤散

二十問二十一問有
蟬退釣藤飲可參用

釣藤勾

三錢

蟬蛻

天

防風

蝎尾

人參

各半兩

麻

去節

僵蠶

炒

甘艸

炙

川芎

各一錢

麝香

不拘多少

右爲末。白水煎寒多加附子末半錢。

琥珀丸

詳十五

辰砂

半一錢

琥珀

牛黃

僵蠶

炒去絲嘴

南星

製

全蠍

去毒

白附子

代赭石

天麻

乳香

蟬蛻

各一錢

麝香

半錢

冰片

少許

右爲末。三歲半字。薄荷湯下。慢驚加附子。

龍齒散

龍齒

蟬蛻

釣藤

羌活

茯苓

人參

等分

爲末。厚一錢薑湯下。

脾風 第十七

慢脾風之候。面青舌短。頭低。眼合不開。困睡中搖頭吐舌。頻嘔腥臭。禁口咬牙。手足微搐而不及收。或身冷。或身溫而四肢冷。其脉沉微。陰氣極盛。胃氣極虛。十救一二。蓋由慢驚之後。吐瀉損脾。病傳已極。總歸虛處。惟脾所受。故曰脾風。若逐風則無風可逐。若療驚則無驚可療。但時間痰涎虛熱往來。其眼合者。脾困氣乏。神志沉。痰涎凝滯。然爾世所謂慢風難療者。慢脾風是也。然慢脾風一名虛風。凡小兒或吐或

瀉之後。面色虛黃。大勢虛損。若因虛而發熱。繼此必
得慢脾風。纔見搖頭直視。以手摸人。昏困喜睡。額上
汗多。身亦黏汗。其聲沉小而焦。卽是脾風之症。不必
皆由急慢傳風。治法大要。生胃回陽。黑附湯。川烏散。
金液丹。白丸子各一半。生附四君子湯。可斟酌。胃氣
漸復。則異功散。輩溫平而調理之。如蝎附散。陰癰散
等。亦可參用。若其眼半開半合。手足不冷。症候尚在。
慢驚。則不必用回陽。或已入慢脾。而陽氣未盡脫者。
亦不可用硫黃附子丸服。回陽湯劑。手足漸暖。身

以醒脾散等繼其後以調之不可輕易用極

黑附湯

治慢脾風盛四肢厥冷者
手足緩而難省即止後劑

附子

炮三錢

木香

一錢半

白附子

一錢

甘艸

右剉散每服三錢薑五片煎取其半以匙送下

川烏散

祛風回陽

川烏

生一錢

全蝎

木香

各半

嘔吐丁香

右末每三字薑三片煎取其半旋滴入口中

金液丹

治吐利日久脾胃虛損手足厥逆精神昏
睡寒多露睛口鼻氣冷欲成慢驚風者

船上硫黃

十兩先飛抹去砂石稱研為細末
入罐內再入赤石脂封縫鹽泥固

濟炭火煨三晝
夜取出候冷用

右以柳木槌研爲細末。每服二錢。生薑湯下。

生附四君子湯

助胃回陽。卽前四君子湯加生附子末四分之
一。厥冷者對加。每服半錢。水煎以匙送下。

異功散

人參

茯苓

白朮

甘艸

橘紅

木香

等分

右爲末。每服三字。薑棗煎服。

蠲附散

同陽氣製風痰

全蝎

一个

附子

炮二錢

南星

炮

白附子

炮

木香

各一錢

右爲末每服半錢薑三片煎服

醒脾散

全蝎

焙半錢

白附子

炮

天麻

焙

甘艸

炙

人參

白茯苓

石菖蒲

木香

石蓮肉

白朮

各一錢

右爲末每服三字薑棗煎服

陰癰散

祛風豁痰回陽正氣

白附子

黑附子

南星

半夏

並生各一分半

右爲末井水浸七日逐日換水浸訖控乾次入全蝎末二錢每服一字生薑湯下

急慢脾風下痰輕重 第十八問

慢驚下痰輕者神寶既濟丹白僵蠶丸重者神砂存
甚則七寶妙砂丹灸慢脾慢風驚逆惡症候諸藥不
效者如有太衝脉則取百會穴灸之此治慢脾風之
大要然也急驚亦下劑有三輕下則用定命丹利驚
丸防風湯宣風散枳殼散小柴胡湯輩重下則用青
金丸天麻丸蘆薈散牛黃涼膈丸青金丹王監京墨
丸輩稍重下則用揭風湯朱砂膏疎風散柴胡加大
黃湯輩下之後宜和氣助胃如生氣散銀白丸茯苓

二陳湯異功散天麻蘇合香丸參苓白朮散和中散
醒脾散之類皆可選用。凡急驚眼睛翻轉口中出血
兩足擺腹肚搐摸體循衣氣促噴藥口中痛絕大叫
者難治。慢驚四肢厥冷吐瀉咳嗽面黑唇慘鴉聲兩
脇動氣口生白瘡髮直搖頭眼睛不轉涎鳴喘噎口
眼手足一邊牽引者難痊。慢脾身冷黏汗直臥如尸
喘嗽頭軟大小便不禁口噤頭搖者最難爲力。若急
驚甚者服鎮心丸化痰鎮心或金箔鎮心丸亦可服
珍珠丸下痰亦效。熱甚大便閉者寬熱散下之可也。

神寶既濟丹

前第廿六回

硫黃

焰硝

五靈脂

青皮

陳皮

去白

半夏麴

炒等分

修合法詳十六問中。每服三丸。食前米飲下。

白殭蠶丸

方傳世脾陽氣未甚脫者可用亦能截風

膽星

二錢

直殭蠶

炒

五靈脂

錢子地龍乾

全蝎

焙各一錢

右末。水煮生半夏糊丸。麻子太。每五丸薑湯下。

辰砂膏

治慢脾冷痰壅滯手足冷而微搐

黑附子

一个入錢重者去皮臍頂上刻一孔入辰砂末入錢仍用附子末塞之以

炭火燒存性為度

南星

炮半兩 白附子

五靈脂

蝎梢

各一分

右為末煉蜜丸如桐子大每服一九薑汁湯下

七寶妙砂丹

治痢疾毒効慢驚慢脾通以木香佐之開元通

寶錢皆背後上下有兩月片者其色淡黑頗小

諸錢以一個放鐵匙于炭火內燒少須四圍上

下各出黃白珠子將出候冷傾入盞中只作一

服。南木香煎湯送下。人參湯尤妙。

防風丹

治風熱痰壅大便不通

羌活

防風

枳實

川芎

甘艸

炒

大黃

溼紙裏煨各一錢半

右剉每服三字。薑棗煎服。或加赤芍藥。

宣風散

疎風導熱

雄檳榔

个甘艸

橘紅

各兩半

牽牛

二兩半生半炒

右爲末。每服半字。錢蜜湯調下。

枳殼散

治小兒疳氣腹脹喘急

枳殼一兩 巴豆廿一粒同上
炒黃去之

右爲末三歲小兒半錢砂糖湯調下

小柴胡湯 詳見二十九問

人參 甘艸炙各三錢 黃芩一錢 柴胡八錢

半夏湯泡七次焙乾二錢五分 加枳實防風能利血熱

右到每二錢薑棗煎服

青金丸 治風痰壅盛

巴霜一字 青黛 南星炮各一錢 滑石二錢

全蝎一錢焙

右爲末稀麪糊丸麻子大每一丸薄荷湯送下

天麻丸

南星

炮二錢

白附子

炮

牙硝

天麻

川靈芝

全蝎

焙各一錢

輕粉

半錢

巴霜

一字

右爲末每服一字煎金銀薄荷湯調下

蘆薈散

治驚風痰盛發搐

全蝎

焙五个

巴霜

一字

輕粉

半錢

蘆薈

南星

炮

朱砂

各一錢

冰片

麝香

各一字

鬱金

一分皂角水煮焙乾

右爲末。每服一字。煎金銀薄荷湯調下。

牛黃涼膈丸

治熱盛涎潮

牙硝

寒水石

煨

石膏

甘艸

各半兩

膽星

二錢半

紫石英

一錢

牛黃

片腦

麝香

各半分

右末。甘艸膏九菴豆大。每服一九。橘皮湯調下。

青金丹

疎風利痰

蘆薈

牙硝

青黛

各一錢

史君子

硼砂

輕粉

半錢

蜆梢

十四個

右爲末。香墨水九麻子大每服一九薄荷湯下。

王監京墨丸

治痰熱驚積楚州王監賣此藥著名者

青黛

史君子

炒熟

蘆薈

膽星

各二錢

川墨

二錢

藏粉

麝香

半錢

水片

一字

右末飛麩糊丸桐子大每服一九薄荷湯調下。

揭風湯

治利下痰熱

青黛

蘆薈

全蝎

各一分

南星

半兩爲末調作

餅包裏煎項煨令赤盡

朱砂

一錢半

牙硝

輕粉

各三字

右爲末。每服一字。煎金銀薄苛湯調下。

朱砂膏

治驚風痰盛

朱砂

一錢

牙硝

一錢

川靈芝

一錢

蘆薈

一錢

麝香

一字

冰片

一字

右末。甘艸膏九菴豆大。金箔衣。薄苛湯下一丸。

疎風散

治驚風痰熱俱盛

檳榔

陳皮

各二錢

牽牛

大黃

煨各二錢

右爲末。每服半錢。生蜜調下。

銀白散

糯米

炒二兩

扁豆

蒸二兩

藿香

分

白朮

分

丁香

二錢

甘艸

炙三錢

右爲末。紫蘇米飲調下。

柴胡加大黃湯

柴胡

一兩

黃芩

炙

人參

炙

半夏

製

生薑

各三錢半

甘艸

炒一錢半

大黃

少許

右劉散每服一錢入棗煎服

生氣散

治諸風疎利以此調氣

丁香

七分

白朮

炙

青皮

炙

甘艸

炙

木香

人參

各二錢

右爲末。每服半錢。沸湯點服。

異功散

人參

茯苓

白朮

甘艸

橘紅

木香

各等分

右剉散。每服二錢。薑棗煎服。

茯苓二陳湯

和胃氣化痰涎

半夏

五錢

陳皮

二錢半

茯苓

四錢

甘艸

一錢半

右判。每服三錢。薑三片。煎服。

天麻蘇合香丸

天麻

防風

人參

辰砂

雄黃

麝香

甘艸

炙各一分

全蝎

炒

薑蠶

炒各半兩

牛黃

少許

星

一錢

蘇合油

右爲末煉蜜丸如桐子大每服一九薄苛湯下

參苓白朮散

一名和中散

扁豆

炒

人參

茯苓

白朮

土炒

甘艸

炙

山藥

各二錢

米仁

砂仁

蓮肉

桔梗

各一錢

天麻

藿香

各五分

右末每二錢棗湯下

醒脾散

全蝎炒半錢 白附子炮 天麻焙 甘艸炙

石菖蒲 白茯苓 人參 木香

石蓮肉 白朮各一錢

右剉每二錢薑棗煎服

鎮心丸

朱砂 龍齒 牛黃各一錢 麝粉

琥珀 人參 茯苓 防風各一錢

全蝎

七個

右末煉蜜丸如桐子大每服一九薄荷湯下

金箔鎖心丸

朱砂

一兩

白茯苓

半兩

人參

半兩

麝香

半錢

甘艸

半兩

片腦

一錢

紫河車

二錢半

黑豆煮

牙硝

五錢

山藥

一兩

金箔

十二貼

為衣

右為末蜜丸桐子大薄荷湯下

珍珠丸

白附子

滑石

巴豆

十五粒

去油

南星

錢各一

全蝎

半錢

右末蜜丸小豆大葱白湯下

驚癇 第十九

發癇者。小兒之惡病也。幼小血脉不斂。骨氣不聚。爲風邪所傷。驚悸所觸。乳哺失節。停滯經絡而得之。其候神氣怫鬱。瞪眼直視。面目牽引。口噤涎流。腹肝膨緊。手足搐掣。似生似死。或聲或默。或項背反張。或腰脊強直。但四肢柔軟。發而時醒者。爲癇。若一身強硬。終日不醒。則爲瘖瘖矣。癇曰五癇。病關五臟。面赤目暈。吐舌噴齒。心下煩燥。氣短息數者。曰心癇。而唇俱青。其眼上竄。手足拳攣。抽掣反折者。曰肝癇。面黑而

晦振目視人。口吐清沫。不動如尸者曰腎癰。面如枯
骨。目白直視。驚跳搖頭。口吐涎沫者曰肺癰。面色痿
黃。眼睛直視。腹滿自利。四肢不收者曰脾癰。此五臟
之證然也。調理之法。惟以驚風食三種。陰陽二證。別
而治之。風癰者。汗出解脫。風邪乘虛。其初屈指數有
熱生痰是也。驚癰者。震駭恐怖。打墜積驚。其初驚叫
大啼。恍惚失魂是也。食癰者。食時得驚。停宿結滯。其
初吐乳不哺。大便秘臭。或結成乳癰。先寒後熱。是也。
別之以陰陽。始者身體有熱。抽掣啼叫。是驚癰也。

病脉浮面色光澤病在六腑肌膚此猶易愈始者身
體無熱手足清冷不抽掣啼叫是爲陰癇陰病脉沉
面色黯晦病在五臟骨髓此最難痊或以仰臥屬陽
覆臥屬陰亦可參驗蓋陽證不可用溫陰證不可用
寒風癇先爲之散風驚癇則爲之利驚食癇則先爲
之消積續以定癇等劑主之大蓋血滯心竅邪氣在
心積驚成癇通行心驚調和心血順氣豁痰又其要
也繼令小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安時常驚
悸此皆發癇之漸卽以紫霜丸導之時間量與紫霜

九減其盛氣則無驚風癇癇之患其證方萌耳後高
骨間必有青紋紛紛如線見之急爲抓破須令血出
啼叫尤得氣通漸濯兒衣不可夜露恐爲無辜鳥羽
糞所落汙染未有不爲癇也挾邪怪者其色變易不
常見人怕羞諸癇瘡不能言者蓋咽喉爲氣之道路
風傷其氣以掩其道路之間抑亦血滯於心心竅不
通所致耳南星調雄豬膽汁少許各星蘇散啖之取
効若錢氏五癇丸并南星散以菖蒲煎湯調下牛黃
猪心湯以和蘇合香丸若治癇之要藥也故

之許叔微治小兒顛癇欲發眼暗瘳癰瘻瘰癧
黃丸主之治風癇宜服薄苛散有熱宜服細辛大黃
湯又有蛇黃丸養生必用方斷癇丹散風丹保安丸
獨活湯牛黃丸比金膏虎睛丸七寶鎮心丸清神湯
蜜陀僧飲食癇通用妙聖丹天麻丸斷癇丸當歸大
黃湯蝎虎散代赭石散日應丹地龍散全蝎五癇丸
星珠散可選而用之輕者化風丹亦可服

紫霜丸

代赭石

煅醋碎
七次

赤石脂

各六錢

杏仁

五十枚
去皮尖

巴豆

三十枚
去皮
膜心
油

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏却入代
赭石脂末研勻。以湯浸蒸餅爲丸如粟米大一
歲服五丸米飲吞下一二百日內見三丸乳片
下更宜量其虛實加減微利爲度。此藥兼治驚
痰諸疾雖下不致虛人。

星蘇散

與第十六問天
南星散通用

治諸風口噤不語

天南星

畧炮剉散
每服一錢

本藥片紫蘇五葉煎取其半却
許溫和服凡不語者大小便須要疎導治慢
不語只用南星以人參石菖蒲爲佐

五癰丸

治食癰

硃砂

半兩

水銀

二錢

雄黃

一兩

真珠

一兩
細研

右爲末煉蜜爲丸麻子大每服二丸金銀煎湯

送下

雌黃丸

治顛癇搖掣惡聲嚙舌

雌黃

黃丹

微炒各半兩

麝

半錢

右為末拌和用牛乳汁三合熬成膏入藥末杵三百下丸如麻子大每服二丸溫熱湯下

薄荷散

薄荷葉

半兩

羌活

全蝎

甘艸

麻黃

去節

蠶絲

炒去

天竺黃

白附子

各半錢

右為末薄荷湯下熱極生風加竹瀝少許其
又一方有柴胡台芩桔梗茯苓無全蝎蠶絲

黃白附子

細辛大黃湯

治風癰內熱

天麻

防風

各半兩

細辛

大黃

焙

川芎

各二錢半

甘艸

炙一錢半

右剉散每服一錢入犀角少許煎服

楊氏蛇黃丸

治諸癰

蛇黃

一箇煨醋淬七次研細

鬱金

雄黃

硃砂

青礞石

各錢

鐵粉

研細

右爲末。粳米飯丸。桐子大。每服一九。人參煎湯調下。

錢氏蛇黃丸

治驚癇

蛇黃

三箇火煨醋淬

鬱金

七分半

麝香

一字另研

右爲末。粳米飯丸。如桐子大。每服二二丸。煎銀磨刀水化下。

卷生必用蛇黃丸

蛇黃

一枚火
取醋淬

青礞石

辰砂

雄黃

各二錢

鐵鐸粉

四錢研
極細

右末化蒸餅爲丸用金銀剪刀股湯五歲已上
吞下幼小化下如麻子大丸。

斷癰丹

治癰差後復作。證候多端連綿不除。

黃芪

蜜水
塗炙

藤勾

細辛

去根
去葉

甘艸

炙各
半兩

蟬蛻

四箇洗
去土

蛇退皮

三寸酒
塗炙

牛黃

一字
另研

右末煮棗肉為丸如麻子大煎人參湯下一歲

十九大小加減
散風散

治風癰先用此

牛膽南星 一錢

羌活

獨活

防風

天麻

人參

六錢

荊芥

川芎

細辛

各一錢

右為末煉蜜為丸桐子大每服二丸薄荷紫蘇

湯調下

保嬰丸

治諸風癰久遠亦驗

川烏

生去皮尖
二錢半

五靈脂

炒
兩

右爲末猪心血丸如桐子大每服一九薑汁泡
湯調下

獨活湯

治風癰解表通裏

獨活

麻黃

去節

川芎

各一錢

大黃

焙

甘艸

炒各半錢

右剉散每服二錢薑二片煎服

牛黃丸

治風癇迷悶搐掣涎潮

牛膽南星

麝

五分

全蝎

蟬蛻

各二錢半

防風

白附子

生

天麻

殭蠶

炒各一錢五分

右爲末以煑棗去皮核取肉和水銀半錢研極細入藥末丸如菉豆大每服二丸荆芥生薑湯

調下

比金丸

元驚癇先用此

人參

琥珀

白茯苓

硃砂

遠志

薑製焙去心

天麻

石菖蒲

細節名

川芎

南星

青黛

各一錢

麝

一字

右爲末。煉蜜九桐子大。每服一九薄苛湯調下。

虎睛丸

治驚癇邪氣入心

虎睛

細研

遠志

薑製沒

犀角

石菖蒲

大黃

溫細

麥門冬

各一錢半

蜣螂

去足翅炒三枚

右爲末粟米糊丸桐子大每服一九竹葉煎湯
調下或金銀煎湯下

七寶鎮心丸

治驚癇心熱

遠志肉

薑製片

雄黃

鐵粉

琥珀

硃砂

各一錢

金銀箔

二十片

麝香

少許

右爲末棗肉丸桐子大每服一九去心麥門冬

湯送下

神湯

治驚癇

犀角

遠志

薑製去心

白蘇皮

人參

石菖蒲

甘艸

炙各一錢

右爲末每服一錢去心麥門冬煎湯調下

蜜陀僧飲

治驚癇入心不語神効諸驚失音大人通用

右蜜陀僧爲末每服一字米醋湯調下大人用

一錢熱酒調下

妙聖丹

治食癰通用

代赭石

煅醋淬五分

雄黃

蠟稍

硃砂

各一錢

輕粉

麝香

各一字

巴豆

三箇去心膜出油

杏仁

去皮尖微炒二錢

右爲末蒸棗肉丸桐子大每服一九木通煎湯

調下

大麻丸

南星

炮二錢

白附子

炮

牙硝

天麻

五靈脂

全蝎

焙各一錢

輕粉

五分

巴霜

右爲末稀糊爲丸麻子大每服三九薄荷薑煎

湯送下

斷癰九

治諸癰痰盛

皂角

盈尺者三挺出皮挺碎用水一升浸取汁濾過銀器內熬成膏

白礬

煅枯研細一兩半

南星

濕紙炮熟一兩

硃砂

直薑蘇

炒

雄黃

另研

白附子

各半兩

烏蛇

酒浸取肉焙二錢半

麝

一錢

赤蜈蚣 一條去頭足酒浸炙

右爲末同水煮半夏糊和皂角膏爲丸桐子大

每服一九薑湯調下

當歸大黃湯

治諸癰壯熱利下心中惡血

大黃 濕紙裹

甘艸 炙

當歸 各三錢

赤芍藥 二錢五分

半夏 製

川芎 各一錢半

右爲末每服一錢薑棗煎服

蝎虎散

治驚癇屢効

褐色生蝎虎

一箇連
血紅研

右入硃砂末并麝少許同研薄苛湯調下作一服數年顛癇亦効蓋癇疾皆心血虛滯生蝎當以官守其血繼是以二陳湯與之若無生蝎當取帶性雄猪心血代用入代赭石散中亦効

代赭石散

治陰陽癇通用

代赭石

煨醋淬研爲末
水飛過日乾

右爲末每服半錢以金銀煎湯和金銀箔調下
連進二服良久小兒脚脛上自有赤斑卽邪氣
發出其病隨瘥若無赤斑卽難治也

日應丹

治顛癇連年不瘥

黑錫

硫黃

水銀

鐵粉

研各半兩

金銀箔

三片

右水銀鐵粉金銀箔夾和一處先將黑錫於銚
內鎔開次入硫黃不住手就銚內碎攪候硫黃

烟氣欲息。次入餘藥。就火上同攪。少頃。時傾出。地上一宿。出火毒。再研細。粳米飯丸。麻子大。砂衣。每服三九。食後人參湯下。

地龍散

治諸癰發熱無時

乾地龍

焙半兩

虎睛

人參

天竺黃

代赭石

煅醋淬

硃砂

鐵粉

各二錢半

輕粉

五分

雄黃

一錢半

金銀箔

三十片

右爲末。每服五分。紫蘇湯調下。

全蝎五疳丸

治小兒五疳

赤蜈蚣

一條去頭足酒浸炙

南星

炮二錢半

麝香

一字

全蝎

防風

硃砂

細研

遠志

薑製焙去心

白附子

生

蘆薈

延胡索

各一錢

金銀箔

三十片

右爲末入麝糕糊丸桐子大每服一九苜蒲紫

蘇湯調下

星珠散

定痛利痰

南星

濕紙裹炮
香熟一兩

硃砂

一錢

右爲末帶性豬心血爲丸桐子大每服一九防風調下

化風丹

涼風化痰退熱定搐

膽南星

羌活

獨活

防風

天麻

人參

去蘆

川芎

荊芥

粉草

全蝎

各等分

右爲末。煉蜜九。芡實大薄荷湯下。一方加辰砂麝香少許。

鎮驚丸

治一切驚癇

紫石英

燒醋淬

鐵粉

遠志

益氣清心

輕粉

各七分半

茯神

人參

琥珀

滑石

南星

炮

龍齒

蛇黃

醋淬

熊膽

各二錢半

右爲末。煉蜜九。如桐子大。硃砂爲衣。每一丸。

銀湯下或用猪乳調抹入口中

開牙散

細辛

南星

朴硝

各錢

麝香

五分

蝎梢

七箇

右末以少許用烏梅肉揉和擦牙兼用細辛皂角荆芥末吹入鼻中治諸風搐搦驚癇用此
閑竅與前十四問開闔散通用

驚風 第二十回

驚者虛惕怔忡氣怯神散痰涎來去其瀉必青漸生
風而未至風也驚邪入心則面紅臉赤惕惕夜啼驚
邪入肝則面目俱青眼睛竄視驚邪入腎則面黑惡
叫囓舂咬牙驚邪入肺則面目淡白喘息氣乏驚邪
入脾則嘔吐不食虛汗多睡面色淡黃據脉觀之虛
則散而濡實則數而駛治法鎮驚化痰安神定志亦
須究竟何臟受病之處而調理之然有所謂溫驚有
所謂利驚有所謂涼驚虛者溫之實者利之熱者涼

之是謂治法。腫中驚啼聲浮者易治。沉者聲不響難

痊。又有驚積者。受驚日久。積而成之。其狀額上有汗。

喘息煩渴。潮熱往來。肚腹有熱。睡中覺腹內有物跳

動。瀉下如白脂豆沙是也。治法量輕重而疎導之。仍

與調氣和胃取愈。大凡小兒腹中或熱或脹或硬皆

爲內實。法當疎利。辰砂膏青龍丸主之。凡疎利之劑

皆可隨證用之。熱甚心經煩渴者。至寶丹解之。羌活

散防風導赤散。蟬蛻釣藤飲。天麻丸等劑皆可服。大

便秘澀者。七寶洗心散加辰砂治之。大小便不利。

神效丸寬熱散極效輕者化風丹可服安神丸

辰砂膏

辰砂

二錢

蓬砂

一錢

馬牙消

錢

玄明粉

錢二

全蠍

一箇

真珠末

錢一

麝香

一字

右爲末和畢用好油紙封裹自然成膏每服一

豆粒許諸驚金銀箔薄荷湯下潮熱甘艸湯下

用內用乳汁調傅乳上令兒吮下

青龍丸

治驚積有熱

卷二
三

青黛 茯苓 蘆薈 南星 炮各一錢

麝香 少許 輕粉 巴霜 各一字 全蝎 焙三錢

右先將巴豆研如泥。次入諸藥研極細。丸如梧
桐子大。硃砂為衣。每服一九薄荷湯下。

王寶升

治諸癰急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風
涎搐搦及傷寒狂語伏熱嘔吐並宜治之。

生犀屑 生玳瑁屑 琥珀 研細小飛

雄黃 研細小飛 金箔 五片

銀箔

五十片

片腦

麝香

各一錢

研細

牛黃

半兩

安息香

半兩

石末

取一兩

慢火熬

至

成膏

將

右生犀玳瑁屑搗羅爲細末研入諸藥令勻將

安息香膏以重湯煮化和搜爲劑如乾卽入少

熟蜜盛瓷器中旋丸如桐子大二歲兒服二丸

人參湯化下大小以意加減又治大人卒中不

語中惡氣中諸物毒中熱暗風產後血暈死胎

不下竝用童子小便一合生薑自然汁三五滴

同溫過化下五丸立效

神妙奪命丹

七月取青蒿節內蟲入硃砂麝香爲丸加片腦
人參羌活湯

治傷寒驚熱或中風體硬加麻黃乾葛薤白仁

川羌活 獨活 前胡 柴胡

白茯苓 川芎 桔梗 枳殼

人參 地骨皮 天麻 各等分 甘艸 減半

右剉散生薑薄荷煎服加蟬蛻治驚熱

防風導赤散

治小兒初驚

生地黃

木通

去節

防風

川芎

各等分

有熱加黃芩赤芍藥羌活

右剉散每服三錢水一盞竹葉少許同煎

蟬蛻釣藤飲

治肚疼驚啼又十六間有釣藤散可兼看對

釣藤

天麻

茯苓

川芎

白芍藥

各二錢

甘艸

蟬蛻

各一錢

右剉散燈心煎加木通麥門冬防風羌活

天麻丸

南星

炮二錢

白附子

炮

牙硝

天麻

五靈脂

全蝎

焙各一錢

輕粉

五分

巴霜

一字

右爲末糊爲丸麻子大每服三九薄荷薑湯服

寬熱散

石膏

黃芩

甘艸

赤芍藥

葛根

各二錢半

麻黃

去節

柴胡

半兩

右剉散三歲兒每服二錢水一小盞生薑少許

葱白三寸豉一撮

七寶洗心散

治小兒煩熱生瘡兼治驚風。

生地黃 荆芥穗 防風 甘州

黃芩 羌活 赤芍藥

各半分

右爲末。入辰砂減半。加當歸尤妙。每服一錢。燈心薄荷湯下。空心食前服。又三十七問洗心散可兼看對。

神芩丸

治風熱壅滯。頭目昏眩。口舌生瘡。牙齒疳蝕。或

遍身瘡疥咬牙驚惕怔忡煩躁多渴或大小便
澀滯或積熱腹滿驚風潮搐竝皆治之。

大黃

生

黃芩

各二兩

生牽牛末

一兩

滑石

四兩

黃連

薄荷葉

川芎

各半兩

右爲細末滴水丸桐子大每服四五十丸食後
溫水下一方加蒲黃止血證用。

化風丹

膽南星

羌活

獨活

防風

大麻

人參

川芎

荆芥

粉草

全竭

等分

右爲末煉蜜丸芡實大薄荷湯下一方加麝香

辰砂

安神丸

人參

茯神

麥門冬

山藥

冬二錢

龍腦

龍齒

各一錢

寒水石

五分

甘艸

五分

硃砂

五分

金箔

二片

錢氏方有馬牙硝龍腦

右爲末煉蜜丸如芡實大每服一丸燈心湯下

清心丸

治驚熱煩躁

人參

茯神

防風

硃砂

柴胡

各二錢

金箔

三十片

右爲末煉蜜丸桐子大每服一九竹瀝調下